

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»

ГОС. У.

Биологический факультет

Ф. СКОРИНЫ

Кафедра биологии

Студенческая газета



ЭНТОМОЛОГ



Выпуск, сентябрь, 2025

Glaucopsyche alexis

Занесена в Красную книгу Республики Беларусь. В Восточной Европе вид распространен повсеместно, за исключением крайнего севера. В Прибалтике встречается редко, в Польше - очень локально. на территории Беларуси вид чаще встречается на юге страны. За год развивается в одном поколении. Время лёта с мая (на юге - с конца апреля) по июль - начало августа. Бабочки летают у цветущих зарослей бобовых и крестоцветных растений.

Самки откладывают яйца поштучно на цветки и другие части кормовых растений гусениц: астрагал солотколиственный, астрагал, вязель разноцветный, дербенник луговой, чина, люцерна, донник лекарственный, эспарцет, тимьян обыкновенный, чабрец, горошек мышиный, горошек заборный, горошек. Зимует куколка или гусеницы старшего возраста. Стадия куколки (если зимовка проходит на стадии гусеницы) длится 3-4 недели.



Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81

Parnassius mnemosyne

Занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Длина переднего крыла 20-35 мм. Размах крыльев до 70 мм. Усики короткие, булавовидные, чёрные, вершина булавки чёрная. Грудь и брюшко чёрные, покрыты густыми белесоватыми волосками. У самки брюшко сверху голое, блестящее, иногда с жёлтыми пятнами. Крылья округлые, без выступов и вырезов по краям, покрыты редкими чешуйками. Краевая область переднего крыла полупрозрачная, стекловидная. Жилки тёмные, резко контрастируют с фоном по всей длине. Переднее крыло с 2 чёрными пятнами: в центральной ячейке с дискальным пятном, заднее - с более или менее развитым тёмным полем в анальной области и разными по величине и форме пятнами. Половой диморфизм выражен слабо, самки обычно темнее, с более обширными стекловидными участками на крыльях.



Распространён на большей части Восточной Европы, доходя на юге до лесостепей. Встречается во всех прибалтийских государствах и Беларуси.



Источник:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_\(%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0))

Boloria thore

Занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Латинский видовой эпитет происходит от имени Тор (древнегерманская и скандинавская мифологии) - бога грома, бурь и плодородия. Длина переднего крыла 18-25 мм. Верхняя сторона крыльев охристо-оранжевая с контрастными чёрными жилками, поперечными чёрными перевязями в прикорневой части крыльев и рядами округлых пятен чёрного цвета на внешней половине. Нижняя сторона передних крыльев имеет сходную окраску, но с гораздо менее выраженным чёрным рисунком. Нижняя сторона задних крыльев желтовато-рыжая со срединной охристо-жёлтой перевязью и не полным рядом белёсых пятен кнаружи от нее. Наружная половина крыльев имеет два ряда бурых пятен. Пятна в прикраевом ряду имеют округлую форму, краевого - лунчатые с голубыми разводами снаружи



В 1990-х годах вид был найден в центральной части Беларуси (в центральной части страны, в Налибокской пуще и Березинском заповеднике, вероятно, и в других частях на севере и в центре страны), известна также единичная находка вида в Литве.



Источник:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0>

Erebia aethiops

Занесена в Красную книгу Республики Беларусь. У самца длина переднего крыла 22-26 мм. Усики булавовидные, равны половине длины кастиального края переднего крыла, снизу белесоватые. Крылья сверху тёмно-коричневые, каждое с широким коричнево-красным постдискальным полем, на котором расположены чёрные, центрированные белым, глазчатые пятна (3-4 на переднем и 4-5 на заднем крыле). На заднем крыле глазки обычно мельче, их обычно три и ещё одна маленькая точка. Переднее крыло с бархатистым андрокониальным полем, занимающим его базальную половину. Предпочитает холмистую местность, хотя встречается и в горах.



Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0

<p>Учредитель: студенческий актив кафедры биологии специализации «Зоология, физиология и генетика»</p> <p>Авторы напечатанных материалов несут полную ответственность за подбор и точность приведенных фактов.</p> <p>Сайт газеты: http://biology.gsu.by/</p>	<p>ЭНТОМОЛОГИЯ Студенческая газета кафедры биологии биологического факультета ГГУ им. Ф. Скорины</p> <p>Наш адрес: 246019, г. Гомель, ул. Советская, 108, ауд.3-9</p>	<p>Главный редактор: Глазкова В.Д.</p> <p>Редколлегия: Глазкова В.Д.</p> <p>Редактор-оформитель: Азявчикова Т.В.</p>
--	---	--